

# SAPHIR GRAIN

APPÂT SUR GRAIN CONTRE  
RATS BRUNS, RATS NOIRS & SOURIS  
PRÊT À L'EMPLOI

## Présentation du produit

Type de produit	TP14 – Rodenticide
Type de formulation	Appât sur grain, prêt à l'emploi (RB)
Substance active	Brodifacoum N°CAS 56073-10-0
Concentration	0,005% m/m
Amérisant	Benzoate de denatonium 10ppm

## Informations réglementaires

Nom homologué N° d'AMM	SAPHIR GRAIN FR-2014-0097 - Professionnels de la lutte contre les rongeurs
Organismes ciblés	Rats bruns ( <i>Rattus norvegicus</i> ) Rats noirs ( <i>Rattus rattus</i> ) Souris domestiques ( <i>Mus musculus</i> )
Application	Utilisation en intérieur, autour des bâtiment / en zones ouvertes extérieures, directement dans les terriers, décharge et déchetteries (rats uniquement).

## Mode d'action

Le Brodifacoum est un anticoagulant de deuxième génération.  
Les rongeurs meurent d'hémorragies internes quelques jours après  
ingestion de l'appât.

## Conditions et doses d'emploi

Le produit doit être utilisé dans des postes d'appâtage ou des points  
d'appâts couverts et protégés.

### Utilisation en intérieur, autour des bâtiments :

Contre les rats : 50 à 100 g de produit espacés de 5 à 10 mètres.  
Contre les souris : 20 à 30 g de produit espacés de 2 à 5 mètres.

### Utilisation dans les décharges extérieures, déchetteries et zones ouvertes :

Contre les rats : 50 à 100 g de produit par point d'appât espacés de  
5 à 10 mètres ou directement dans les terriers.  
Couvrir ou bloquer les entrées du terrier où est placé l'appât afin de  
réduire le risque que l'appât soit ressorti ou dispersé.

Inspecter les postes après 2 à 3 jours (souris) et 5 à 7 jours (rats) pour  
vérifier que l'appât est accepté, puis une fois par semaine.  
Les produits ne doivent pas être utilisés au-delà de 35 jours sans  
évaluation du statut de l'infestation et de l'efficacité du traitement.

NE PAS utiliser en APPÂTAGE PERMANENT.



## Références et conditionnements

**Réf. R5038** : Vrac avec pelle en seau de 10 kg (Unité)  
**Réf. R4042** : Vrac en sac de 20 kg avec poignée (Unité)  
**Réf. R4043** : Vrac en sac de 10 kg avec poignée (Unité)

## Élimination

Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en  
prenant toutes précautions d'usage. Ne pas rejeter le produit  
dans l'environnement ou les canalisations. Déposer les postes  
d'appâtage usagés en déchetterie ou tout autre centre de  
collecte approprié. L'emballage ayant été en contact avec le  
produit ne doit pas être réutilisé ni recyclé.

## Précautions particulières

Ne pas utiliser dans des zones où l'on peut suspecter une  
résistance à la substance active. Ne pas alterner l'utilisation de  
différents anticoagulants d'efficacité comparable ou inférieure  
aux fins de la gestion de la résistance.  
Pour une utilisation alternée, envisager l'utilisation d'un rodenticide  
non anticoagulant, si disponible, ou d'un anticoagulant plus  
puissant.

Si, après une période de traitement de 35 jours, les appâts  
continuent d'être consommés et qu'aucune réduction de  
l'activité des rongeurs n'est observée, il convient d'en déterminer  
la cause. Vous avez peut être affaire à des rongeurs résistants.

Utiliser les rodenticides avec précaution. Avant toute utilisation,  
lire l'étiquette et les informations concernant le produit.  
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.  
La fiche de données de sécurité est disponible gratuitement sur  
simple demande à l'adresse suivante : [fds@lodi.fr](mailto:fds@lodi.fr)

Les postes d'appâtage contenant **SAPHIR GRAIN** doivent être  
étiquetés avec les informations suivantes :

Nom du produit :	
<input type="text"/>	
<b>Substance active :</b>	Ne pas déplacer, ni ouvrir.
Difénacoum <input type="checkbox"/>	Contient un rodenticide.
Bromadiolone <input type="checkbox"/>	Antidote : Vitamine K1
Brodifacoum <input type="checkbox"/>	En cas d'incident, contacter un centre antipoison.
Autre <input type="checkbox"/>	N°ORFILA : +33 (0)1 45 42 59 59
<input type="text"/>	