

# جاد بلوك

طعم على شكل قلب ضد  
الجرذان الشقراء، السوداء والثفران  
مناسب للأماكن الرطبة

## تعريف المنتوج

ت.ب. 14- سم قوارض	نوع المنتوج
طعم على شكل قلب، جاهز للاستعمال	نوع التركيبة
بروماديلولون	المادة الفعالة
0.005 %	تركيز المادة الفعالة
بنزوات الديناتينوبوم 10 ppm	مادة مضافة

## معلومات تنظيمية

الإسم المسجل	جاد بلوك
رقم التصريح بالتوسيع	19-RAT-III-29-19 - مهنيون بمجال مكافحة القوارض
أنواع القوارض المستهدفة	الجرذان الشقراء الجرذان السوداء الفران المنزلي
كيفية الاستعمال	يستعمل داخل المباني وحولها/ في المناطق المفتوحة الخارجية، مباشرةً في جحور للقوارض، مكب النفايات (الجرذان فقط)، وفي قوات الماجاري (الجرذان الشقراء)

## طريقة عمل المادة الفعالة

عنبر البروماديلولون مضاداً للتخثر من الجيل الثاني. تموت القوارض بنزيف داخلي تظير الأعراض الأولية بـ ٤٠٠ ساعتين من تناول الطعام وتموت القوارض بمعدل ٤ إلى ١٠ أيام بعدها

## شروط وإرشادات الاستعمال

يجب وضع هذا المنتوج في مراكز محمية ومغطاة لجذب القوارض  
استعمال داخل المباني وحولها:  
ضد الجرذان: 60 إلى 100 غ من المنتوج متباعدة بـ 5 إلى 10 أمتار  
ضد الفران: 20 إلى 30 غ من المنتوج متباعدة بـ 2 إلى 5 أمتار  
استعمال في المناطق المفتوحة الخارجية، مكب النفايات:  
ضد الجرذان: 60 إلى 100 غ من المنتوج متباعدة بـ 5 إلى 10 أمتار  
قوافل الماجاري  
ضد الجرذان: 200 إلى 300 غ كل 30 إلى 50 متر

يجب تخصيص مراكز الطعم بعد مرور 2 إلى 3 أيام بالنسبة للفران و 5 إلى 7 أيام بالنسبة للجرذان وذلك للتأكد من قبول الطعام، ومرة كل أسبوع بعد ذلك.  
لا يجب استعمال المنتوج أكثر من 35 يوماً بدون تقييم لوضع الآفة ونجاعة المعالجة.

لا يستعمل كطعم دائم



مرجعية المنتج/طبيعة التعبئة

مرجع رقم R : قوالب بوزن 30 غ غير ملفوفة ، مغلفة في دلو بسعة 10 كلغ (وحدة)

## التخلص من المنتوج

لا يجب التخلص من المنتوج ولا غلاف التعبئة إلا بعد أخذ احتياطات الاستعمال الازمة. لا يرمى مباشرةً في البيئة ولا في قنوات الماء. يجب وضع مراكز الطعم المستعملة في نقط التجمع الملامنة. لا يتم إعادة استعمال ولا تدوير غلاف التعبينة الملائمة للمنتوج

## إرشادات خاصة

لا يستعمل في المناطق المحتمل وجود مقاومة للمادة الفعالة بها  
لا يجب الإستعمال المتقارب لعدة مضادات التخثر ذات فعالية مماثلة أو أقل وذلك لتجنب مشاكل مقاومة  
القوارض  
بالنسبة للاستعمال المتقارب، يمكن استعمال سم قوارض مضاد للتخثر ذو فعالية أكبر أو الإستعانة بسم من نوع آخر

في حالة استقرار تناول الطعم من بعد فترة علاج تتدنى 35 يوماً، مع عدم انخفاض مستوى نشاط  
القوارض، ينبغي تحديد السبب وراء ذلك.

يجب استعمال سم القوارض بحدار. قبل كل استعمال، يرجى قراءة الملصق والمعلومات المتعلقة بالمنتوج.

خطير. يجب احترام احتياطات الإستخدام.

بطاقة المعلومات الأئنية متوفرة مجاناً على الموقع [fds@lodi.fr](http://fds@lodi.fr)  
في حالة تسمم إتصلوا بمركز مكافحة التسمم على الرقم 0801000180 رقم متوفّر 24 ساعة/24 و 7 أيام في الأسبوع.

زوروا الموقع <https://www.sante.gov.ma/Pages/CAPM.aspx>

يجب على مراكز الطعم المحتربة لـ جاد بلوك أن تتوفر على ملصق يتضمن المعلومات التالية.

اسم المنتوج
المادة الفعالة : لا يتم فتحه ولا تحريره
ديبلنوكوم يحتوي على سم فران
بروماديلولون مضاد : فينانين k1
برونيلوكوم في حالة الخطأ المرجو اتصال بمركز مكافحة السوس
N°ORFILA : +33 (0)1 45 42 59 59
آخر